
FLORA DEL VALLE DE TEHUACÁN-CUICATLÁN

Fascículo 84. ANACAMPSEROTACEAE

Gilberto Ocampo-Acosta*

*Botany Department
California Academy of Sciences



INSTITUTO DE BIOLOGÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

2011

Primera edición: abril de 2011
D.R. © 2011 Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Biología. Departamento de Botánica


ISBN 968-36-3108-8 Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán
ISBN 978-607-02-2165-1 Fascículo 84



Este fascículo se publica gracias al
apoyo económico recibido de la
Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad.

Dirección del autor:

Botany Department
California Academy of Sciences
55 Music Concourse Drive, Golden Gate Park
San Francisco, CA 94118



En la portada:

1. *Mitrocereus fulviceps* (cardón)
2. *Beaucarnea purpusii* (soyate)
3. *Agave peacockii* (maguey fibroso)
4. *Agave stricta* (gallinita) Dibujo de Elvia Esparza

ANACAMPSEROTACEAE¹ Eggli & Nyffeler Gilberto Ocampo-Acosta

Bibliografía. Angiosperm Phylogeny Group III. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. *Bot. J. Linnean Soc.* 161: 105-121. Applequist, W.L. & R.S. Wallace. 2001. Phylogeny of the Portulacaceous cohort based on *ndhF* sequence data. *Syst. Bot.* 26(2): 406-419. Brockington, S.F., R. Alexandre, J. Ramdial, M.J. Moore, S. Crawley, A. Dhingra, K. Hilu, D.E. Soltis & P.S. Soltis. 2009. Phylogeny of the Caryophyllales sensu lato: revisiting hypotheses on pollination biology and perianth differentiation in the core Caryophyllales. *Int. J. Plant Sci.* 170(5): 627-643. Correll, D.S. & M.C. Johnston. 1970. Portulacaceae. In: D.S. Correll & M.C. Johnston (eds.). *Manual of the Vascular Plants of Texas*. pp. 605-611. Hershkovitz, M.A. & E.A. Zimmer. 1997. On the evolutionary origins of the cacti. *Taxon* 46(2): 217-232. Nyffeler, R. 2007. The closest relatives of cacti: insights from phylogenetic analyses of chloroplast and mitochondrial sequences with special emphasis on relationships in the tribe Anacampseroteae. *Amer. J. Bot.* 94(1): 89-101. Nyffeler, R. & U. Eggli. 2010. Disintegrating Portulacaceae: A new familial classification of the suborder Portulacineae (Caryophyllales) based on molecular and morphological data. *Taxon* 59(1): 227-240. Ocampo, G. & J.T. Columbus. 2010. Molecular phylogenetics of suborder Cactineae (Caryophyllales), including insights into photosynthetic diversification and historical biogeography. *Am. J. Bot.* 97(11): 1827-1847. Ronse De Craene, L.P. 2008. Homology and evolution of petals in the core eudicots. *Syst. Bot.* 33(2): 301-325. Rowley, G.D. 1994. *Anacampseros* and allied genera: A reassessment. *Bradleya* 12: 105-112. Stevens, P.F. 2001. Angiosperm Phylogeny Website. Version 9, June 2008. <http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/>. Tropicos.org. Missouri Botanical Garden. 08 Apr 2011 <http://www.tropicos.org>.

Hierbas perennes o **arbustos** bajos (*Grahamia* Gillies ex Hook. & Arn. y *Talinopsis* A.Gray), generalmente con raíces tuberosas. **Hojas** alternas dispuestas en roseta, opuestas o fasciculadas, simples, enteras, sésiles, axilas con tricomas, cerdas o escamas papiráceas (*Anacampseros* L. sect. *Avonia* (E.Mey. ex Fenzl) Gerbaulet); láminas carnosas, teretes o rara vez aplanas, glabras o tomentosas. **Inflorescencias** laterales o terminales, cimosas o tirsoïdes generalmente con pocas flores o bien solitarias. **Flores** actinomorfas, bisexuales, **cálix** con 2 sépalos, connatos en la base, generalmente persistentes en fruto; **corola** con 5 pétalos, libres o ligeramente connatos en la base, rara vez formando una capucha sobre el fruto inmaduro, pronto deciduos; **estambres** 5-numerosos, libres o adnatos a la base de los pétalos, anteras basifijas, dehisencia longitudinal; **ovario** súpero, 3-carpelar, 1-locular, óvulos numerosos,

Ilustrado por Albino Luna

¹ Este fascículo se publica gracias al apoyo económico recibido de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

placentación libre central, estilo con 3-5 ramas estigmáticas. **Frutos** capsulares, 3-valvados, loculicidas, el exocarpo se separa del endocarpo en el fruto maduro (excepto *Grahamia*); semillas por lo general angulares, la testa con dos capas, la exterior por lo general separándose parcial o casi completamente de la capa interior; embrión paralelo al perispermio y más bien recto.

Discusión. Algunos taxa de ésta familia han sido considerados tradicionalmente como parte de Portulacaceae; no obstante, los estudios filogenéticos con base en datos moleculares demuestran que la familia no es monofilética (Hershkovitz & Zimmer, 1997; Applequist & Wallace, 2001; Nyffeler, 2007; Nyffeler & Eggli, 2010; Ocampo & Columbus, 2010).

Nyffeler & Eggli (2010), con base en datos tanto moleculares como morfológicos y anatómicos, proponen la segregación de Portulacaceae en cuatro familias (Anacampserotaceae Eggli & Nyffeler, Montiaceae Raf., Portulacaceae Juss. y Talinaceae Doweld), concepto que aquí se sigue.

Estudios recientes han concluido que los “sépalos” y “pétalos” de taxa del orden Caryophyllales son de origen bracteal (Ronse de Craene, 2008; Brockington *et al.* 2009) y por lo tanto, tales partes no son homólogas a las partes florales de otras angiospermas. No obstante, para evitar confusión, en este trabajo se emplea la terminología tradicional.

Anacampserotaceae se ubica en el orden Caryophyllales (APG III, 2009) y aunque sus relaciones con otras familias no están claras, estudios moleculares demuestran que está cercanamente relacionada con Cactaceae, Portulacaceae y Talinaceae (Hershkovitz & Zimmer, 1997; Applequist & Wallace, 2001; Nyffeler, 2007; Nyffeler & Eggli, 2010; Ocampo & Columbus, 2010). *Talinopsis*, género endémico a Norteamérica, representa el linaje más basal de la familia (Applequist & Wallace, 2001; Nyffeler, 2007; Nyffeler & Eggli, 2010).

Diversidad. Familia con 3 géneros, *Anacampseros*, *Grahamia* y *Talinopsis* (los dos últimos monotípicos) y cerca de 36 especies, la gran mayoría endémicas de África. En México se encuentran solamente *Anacampseros coahuilensis* (S.Watson) Eggli & Nyffeler y *Talinopsis frutescens* A.Gray, esta última en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán.

Distribución. De Estados Unidos a Sudamérica, África (regiones meridional y oriental) y Australia.

1. *TALINOPSIS* A.Gray

1. *TALINOPSIS* A.Gray, Smiths. Contr. Knowl. 3(5): 15. 1852.

Bibliografía. Wilson, P. 1932. *Talinopsis*. In: N.L. Britton, W.A. Murrill & J.H. Barnhart (eds.). *N. Amer. Fl.* 21: 290.

Talinopsis frutescens A.Gray, Smiths. Contr. Knowl. 3(5): 15. 1852. *Grahamia frutescens* (A.Gray) G.D.Rowley, Bradleya 12: 108. 1994. TIPO: ESTADOS UNIDOS: Western Texas to El Paso, New Mexico, C. Wright 36, oct 1849 (holotipo: GH!; isotipos: GH!, MO! <http://www.tropicos.org/Image/31089>, NY!).




Fig. 1. *Talinopsis frutescens*. -a. Rama con hojas, flor y frutos. -b. Detalle de la hoja. -c. Flor. -d. Detalle del fruto inmaduro. -e. Fruto maduro. -f. Fruto abierto mostrando las semillas. -g. Semillas. -h. Detalle de la ornamentación de la semilla.

Arbustos o subarbustos, 25.0-60.0 cm alto, glabros excepto en las axilas de las hojas; raíces fibrosas y tuberosas. **Tallos** jóvenes y ramas delgadas ligeramente comprimidos lateralmente. **Hojas** deciduas en la temporada de sequía, opuestas o fasciculadas, entrenudos con mechones de tricomas 0.5-0.7 mm largo, blancos o pardo-amarillentos; láminas 0.6-1.5 cm largo, 0.1-0.2 cm ancho, teretes, base cuneada, ápice agudo, ligeramente carnosas, glabras. **Inflorescencias** en cimas sésiles, con pocas flores. **Flores** con **sépalos** 5.0-8.0 mm largo, 3.0-4.0 mm ancho, ovados a elíptico-ovados, obtusos, persistentes en el fruto; **pétalos** imbricados, 0.7-1.0 cm largo, 0.4-0.5 cm ancho, elípticos a oblango-elípticos, ápice redondeado, amarillos; **estambres** 20-25, filamentos 3.0-4.0 mm largo, anteras 0.6-0.7 mm largo, 0.4-0.5 mm ancho, oblongas a elípticas, 2-loculares; **ovario** ca. 2.0 mm largo; estilo ca. 1.0 mm largo, columnar, estigmas 3, 1.0-1.3 mm largo, oblongos. **Cápsulas** 1.0-1.2 cm largo, 0.3-0.4 cm ancho en la parte media, fusiformes, dehiscentes longitudinalmente desde el ápice, valvas del exocarpo pardo oscuras, recurvadas, endocarpo 6-valvado, blanco a pardo-amarillento, papiráceo, recto, a menudo se encuentran frutos de la temporada anterior en las ramas viejas; semillas 1.9-2.4 mm largo, 1.0-1.3 mm ancho, arqueadas a cimbiformes, pardas, superficie granulosa.


Discusión. En tratamientos florísticos anteriores registran a la planta con pétalos violáceos, pero en la zona de estudio solamente se han colectado ejemplares con flores de pétalos amarillos. En los estudios filogenéticos con base en datos moleculares se ha encontrado que *Talinopsis frutescens* representa el linaje más basal de la familia Anacampserotaceae.


Distribución. Del sur de Estados Unidos al centro de México. En México se ha registrado en los estados Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Ejemplares examinados. PUEBLA: Mpio. San José Miahuatlán: Cañada del Cosahuico, norte del Cerro Tepetroje, sur de San José Axusco, *Tenorio y Martínez-Correa 17962a* (MEXU); Cerro Tepetroje, 6.5 km suroeste de San José Axusco, *Salinas et al. 4070* (MEXU); 4-7 km sureste de San José Axusco, rumbo a Cerro Petlanco, *Chiang et al. F-2236* (MEXU).

Hábitat. Matorral xerófilo y bosque tropical caducifolio. En elevaciones de 1100 m.

Fenología. Floración y fructificación de agosto a octubre.





OAXACA

DISTRITO	MUNICIPIO	No.
I Coixtlahuaca	Concepción Buenavista	1
	San Cristóbal Suchixtlahuaca	2
	San Francisco Teopan	3
	San Juan Bautista Coixtlahuaca	4
	San Mateo Tlapiltepec	5
	San Miguel Tequixtepec	6
	San Miguel Tulancingo	7
	Santa Magdalena Jicotlán	8
	Santa María Nativitas	9
	Santiago Ihuitlán Plumas	10
	Santiago Tepetlapa	11
	Tepelmeme Villa de Morelos	12
	Tlacotepec Plumas	13
II Cuicatlán	Concepción Pápalo	14
	San Juan Bautista Cuicatlán	15
	San Juan Tepeuxila	16
	San Pedro Jaltepétongo	17
	San Pedro Jocotípac	18
	Santa María Texcatitlán	19
	Santiago Nacaltepec	20
	Santos Reyes Pápalo	21
	Valerio Trujano	22
III Etla	San Francisco Telixtlahuaca	23
	San Jerónimo Sosola	24
	San Juan Bautista Atatlahuaca	25
	Santiago Tenango	26
IV Huajuapam	Asunción Cuyotepeji	27
	Cosoltepec	28
	Ciudad de Huajuapam de Léon	29
	San Andrés Dinicuiti	30
	San Juan Bautista Suchitepec	31
	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	32
	Santa Catarina Zapoquila	33
	Santa María Camotlán	34
	Santiago Chazumba	35
	Santiago Huajolotitlán	36
	Santiago Miltepec	37
	Zapotitlán Palmas	38

DISTRITO	MUNICIPIO	No.
V Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	39
	San Andrés Sinaxtla	40
	San Juan Yucuita	41
	San Miguel Chicaua	42
	San Miguel Huautla	43
	San Pedro Coxcaltepec Cántaros	44
	Santa María Apazco	45
	Santa María Chachoapan	46
	Santiago Apoala	47
	Santiago Huaclilla	48
	Santo Domingo Yanhuitlán	49
VI Teotitlán	Mazatlán Villa de Flores	50
	San Antonio Nanahuatipam	51
	San Juan de Los Cues	52
	San Martín Toxpalan	53
	Santa María Ixcatlán	54
	Santa María Tecomavaca	55
	Teotitlán de Flores Magón	56
VII Teposcolula	La Trinidad Vista Hermosa	57
	San Antonio Acutla	58
	San Bartolo Soyaltepec	59
	San Juan Teposcolula	60
	San Pedro Nopala	61
	Santo Domingo Tonaltepec	62
	Teotongo	63
	Villa de Tamazulapam del Progreso	64
	Villa Tejupam de la Unión	65

PUEBLA

MUNICIPIO	No.	MUNICIPIO	No.
Ajalpan	1	San Gabriel Chilac	17
Altepexi	2	San José Miahuatlán	18
Atexcal	3	San Miguel Ixatlán	19
Cañada Morelos	4	Santiago Miahuatlán	20
Caltepec	5	Tecamachalco	21
Chapultepec	6	Tehuacán	22
Chila	7	Tepanco de López	23
Coxcatlán	8	Tlacotepec de Benito Juárez	24
Coyomeapan	9	Totaltepec de Guerrero	25
Coyotepec	10	Vicente Guerrero	26
Esperanza	11	Xochitlán Todos Santos	27
Ixcaquixtla	12	Yehualtepec	28
Juan N. Méndez	13	Zapotitlán	29
Nicolás Bravo	14	Zinacatepec	30
Palmar de Bravo	15	Zoquitlán	31
San Antonio Cañada	16		

Flora del Valle de Tehuacán-Cuicatlán. Fascículo 84.
Anacampserotaceae, se terminó de imprimir en el mes de
abril de 2011, en los talleres de S y G editores, Cuapinol
52, Col. Pedregal de Santo Domingo, 04369 México, D.F.
sygeditorespress@gmail.com. Se tiraron 300 ejemplares
sobre papel bond de 90 grs. y las cubiertas en cartulina
reciclada concept de 220 grs., el cuidado de la edición
estuvo a cargo de los editores.

FASCÍCULOS PUBLICADOS *

	No. Fasc.		No. Fasc.
Acanthaceae Thomas F. Daniel	23	Fabaceae Tribu Desmodieae Leticia	
Achatocarpaceae Rosalinda Medina L.	73	Torres-Colin y Alfonso Delgado-Salinas	59
Aizoaceae Rosalinda Medina L.	46	Fabaceae Tribu Psoraleeae Rosalinda	
Anacardiaceae Rosalinda Medina L. y Rosa María Fonseca	71	Medina L.	13
Annonaceae Lawrence M. Kelly	31	Fabaceae Tribu Sophoreae Oswaldo	
Apocynaceae Leonardo O. Alvarado-Cárdenas	38	Téllez V. y Mario Sousa S.	2
Araliaceae Rosalinda Medina L.	4	Fagaceae M. Lucía Vázquez-Villagrán	28
Arecaceae Hermilo J. Quero	7	Fouquieriaceae Exequiel Ezcurra y Rosalinda Medina L.	18
Aristolochiaceae Lawrence M. Kelly	29	Gentianaceae José Ángel Villarreal-Quintanilla	60
Asclepiadaceae Verónica Juárez-Jaimes y Lucio Lozada	37	Gesneriaceae Angélica Ramírez-Roa	64
Asphodelaceae J. Gabriel Sánchez-Ken	79	Gymnospermae Rosalinda Medina L. y Patricia Dávila A.	12
Asteraceae Tribu Plucheeae Rosalinda Medina L. y José Luis Villaseñor-Ríos	78	Hernandiaceae Rosalinda Medina L.	25
Asteraceae Tribu Tageteae José Ángel Villarreal-Quintanilla, José Luis Villaseñor-Ríos y Rosalinda Medina-Lemos	62	Hyacinthaceae Luis Hernández	15
Asteraceae Tribu Vernonieae Rosario Redonda-Martínez, José Luis Villaseñor-Ríos	72	Hypoxidaceae J. Gabriel Sánchez-Ken	83
Basellaceae Rosalinda Medina L.	35	Juglandaceae Mauricio Antonio Mora-Jarvio	77
Betulaceae Salvador Acosta-Castellanos	54	Julianiaceae Rosalinda Medina L.	30
Buddlejaceae Gilberto Ocampo-Acosta	39	Krameriaceae Rosalinda Medina L.	49
Burseraceae Rosalinda Medina L.	66	Lauraceae Francisco G. Lorea Hernández y Nelly Jiménez Pérez	82
Buxaceae Rosalinda Medina Lemos	74	Lennoaceae Leonardo O. Alvarado-Cárdenas	50
Cactaceae Salvador Arias Montes, Susana Gama López y Leonardo Ulises Guzmán Cruz	14	Lentibulariaceae Sergio Zamudio-Ruiz	45
Calochortaceae Abisaí García-Mendoza	26	Linaceae Jerzy Rzedowski y Graciela Calderón de Rzedowski	5
Capparaceae Mark F. Newman	51	Loganiaceae Leonardo O. Alvarado-Cárdenas	52
Caprifoliaceae Jose Ángel Villarreal-Quintanilla	58	Malvaceae Paul A. Fryxell	1
Caricaceae J.A. Lomeli-Sención	21	Melanthiaceae Dawn Frame, Adolfo Espejo y Ana Rosa López-Ferrari	47
Celastraceae Curtis Clevinger y Jennifer Clevinger	76	Melastomataceae Carol A. Todzia	8
Cistaceae Graciela Calderón de Rzedowski y Jerzy Rzedowski	6	Meliaceae Ma. Teresa Germán-Ramírez	42
Cleomaceae Mark F. Newman	53	Menispermaceae Pablo Carrillo-Reyes	70
Convallariaceae Jorge Sánchez-Ken	19	Mimosaceae Tribu Acacieae Lourdes Rico Arce y Amparo Rodríguez	20
Cucurbitaceae Rafael Lira e Isela Rodriguez Arévalo	22	Mimosaceae Tribu Mimosae Rosaura Grether, Angélica Martínez-Bernal, Melissa Luckow y Sergio Zárate	44
Cytinaceae Leonardo O. Alvarado-Cárdenas	56	Molluginaceae Rosalinda Medina L.	36
Dioscoreaceae Oswaldo Téllez V.	9	Orobanchaceae Leonardo O. Alvarado-Cárdenas	65
Ebenaceae Lawrence M. Kelly	34	Passifloraceae Leonardo O. Alvarado-Cárdenas	48
Elaeocarpaceae Rosalinda Medina L.	16	Phyllanthaceae Martha Martinez-Gordillo y Angélica Cervantes-Maldonado	69
Erythroxylaceae Lawrence M. Kelly	33	Plocospermataceae Leonardo O. Alvarado-Cárdenas	41
Fabaceae Tribu Crotalarieae Carmen Soto-Estrada	40		

* Por orden alfabetico de familia