

BRACHYTHECIUM HASTIFOLIUM Card. –Viridi - lutescens, nitidulum. Caules intertexti, depressi, regulariter pinnati, ramis valde patulis, elongatis, attenuatis. Folia sicca laxe erecta, madida erecto - patentia, caulina magna. concava, utroque costae latere excavata, e basi decurrente late hastata, in acumen strictum, angustum, elongatum, acutissimum, denticulatum sat subito constricta, ramea minora et angustiora, marginibus inferne integris, superne denticulatis, hic illic et praesertim ad basin acuminis reflexis, costa ad $2/3$ evanida, cellulis longe linearibus, angustis, inferioribus brevioribus et laxioribus, utriculo primordiali plus minus distincto, alaribus multis, quadratis vel breviter rectangulis, subobscuris, chlorophyllosis. Caetera desiderantur.

État de Nuevo Leon : Sierra Madre, Monterey, 1889 (n. 723). Une autre forme un peu plus grêle, verte, à feuilles généralement planes aux bords, paraissant bien appartenir à la même espèce, à Honey - station (État de Puebla), en mélange avec *Entodon Jamesoni*, 1908 (n. 10474 *in parte*).

Par la forme de ses feuilles, cette espèce se rapproche du *B. costaricense* Ren. et Card.; elle en diffère par sa teinte moins pâle, ses tiges régulièrement pennées, ses rameaux plus longs étalés, ses cellules plus vertes, plus étroites, et plus allongées, et ses cellules alaires plus nombreuses, chlorophylleuses, subobscurées. Elle rappelle aussi beaucoup certaines formes du *B. laetum* (Brid.) Br.eur., mais s'en distingue, par ses feuilles caulinaires plus larges, hastées, et par ses cellules alaires plus grandes.