

BRYUM MICROBALANUM Card. - Dioicum. Cespites humiles densusculi, lutescentes, terra obruti, 3 - 5 millim. alti. Folia parva, conferta, madida erecto - patentia, sicca imbricata vix decurrentia, lanceolata, acuminata, nervo valido excurrente breviter cuspidata, marginibus e basi usque ad medium anguste revolutis. integris vel apice parce denticulatis, cellulis brevibus, rhomboidali - oblongis, inferioribus quadratis vel breviter rectangulis. Capsula in pedicello tenui, rubello, 10 - 15 millim. longo, minuta, plerumque abrupte pendula, brevissime ovata vel subglobosa, purpurea, collo crassiore, brevissimo, rotundato, atro - sanguineo, siccitate corrugato, operculo convexo apiculato, nitide rubro.

Estat de Morelos : près de Cuernavaca, 1908 (n. 10662). District fédéral : Cima, en compagnie de *B. argenteum* L., 1908 (n 1527 *in parte*).

Cette espèce, de la section *Doliolidium*, se distingue facilement du *B. coronatum* Schw. par sa petite taille, ses feuilles à bords revolutés à nervure plus brièvement excurrente, sa capsule beaucoup plus petite, proportionnellement plus courte, subglobuleuse, etc. Elle se rapproche davantage du *B. Junghuhnianum*, Hpe. de Java, dont elle diffère toutefois par sa capsule plus courte et plus petite, à col d'un rouge sombre, et par ses feuilles plus allongées, plus fortement et plus longuement revolutées.

Rev. Bryol. 36:112 1909