

DIDYMODON STENOPYNIS Card. – Specie subgeneris *Erythrophyllum*, *D. rubello* Br. eur, et *alpigeno* Vent. europaeis proxima, sed foliis longioribus rete basilari laxo magis extenso, capsulaque longiore angustiore, interdum arcuatula diversa; a *D. rubello* praeterea foliis apice denticulatis, a *D. alpigeno* foliorum marginibus usque apicem acutum versus revolutis distinguitur. Inflorescentia synoica.

District fédéral : Cima, 1908 (n. 10518).

Le *D. acneus* Sch. paraît aussi se rapprocher de notre plante, mais d'après la description qu'en donne C. Müller (*Syn.* II, p. 628), il en diffère par son inflorescence dioïque, et par ses feuilles moins aiguës, souvent subobtus. Le *D. leucodon* (C. Müll.) Broth., du Guatemala, dont le mode d'inflorescence n'est pas connu, appartient encore au même groupe; mais l'auteur lui attribue des feuilles petites, denses, imbriquées, à bords révolutes seulement au-dessus du milieu, ce qui le différencie certainement du *D. stenopyxis*, qui a les feuilles très lâches, flexueuses et crispées à l'état sec allongées (3-4 millim) et révolutes à partir de la base, hyaline.

Rev. Bryol. 36:84 1909