

FISSEDENS(Crenularia) CRENATOSERRULATUS Card. – Caulis perpusillurs, vix 0,5 millim. altus, paucifolius, Folia 3-5-juga, oblongo-lingulata, apice breviter angustata, subacuta obtusave, toto ambitu cellulis, prominentibus crenato-serrulatis, lamina dorsali basi breviter attenuata, alis partis vaginantibus medium versus productis, nervo valido, albido vel sublutescente, pellucido, sub apice evanido, cellulis hexagonis, diam. 8-10 μ , grosse mamillosis, chlorophyllosis. Inflorescentia, dioica. Capsula in pedicello terminali, 1.5 - 2 millim. longo, minutissima, erecta, symmetrica, breviter Ovata, leptoderma.

Etat de Vera-Cruz : près de Jalapa, sur bois pourri, 1908 (n. 15167).

Paraît se rapprocher du *F. tenerrimus* C. Müll., du Brésil, mais d'après la description qu'en donne M. Brotherus (in Act. Soc. Sc. fenn. XLX. n° 5, p. 10), celui-ci est synoïque, et a les feuilles obtusés et la capsule étroite. Rappelle aussi le, *F. exasperatus* Ren. et Card., de Madagascar, qui en diffère par son inflorescence basilaire, sa fronde plus étroite, ses feuilles plus nombreuses, plus petites, à papilles plus saillantes.