

HOOKERIOPSIS HETEROICA Card. -- Heteroica, floribus in
codem caule aliis synoicis, aliis masculis vel femineis, tenella,
depressa, viridula, brunneo-variegata, ramis mollibus, compla-
natis, plumulosis. Folia mollia, patenti-compressa, nullo modo
homomalla, anguste lanceolata, longe acuminata, superne den-
tata, dorsalia lateralique nervis longis, tenuibus, fere parallelis
vel parum divergentibus, ad $2/3$ folii abrupte evanidis, apice
plerumque spinulosis, dorso cristato - detatis intructa, folia
ventralia nervis multo brevioribus et tenuioribus, ad vel infra
medium desinentibus, dorso laevibus; reti tenello, cellulis linea-
ribus, subuniformibus, pellucidis, ad extremitates parce et grosse
granuloso - chlorophyllosis. Capsula in pedicello tenui, rubro,
laevi, 10-12 millim. longo, parva oblonga, fusca, horizontalis
vel nutans, collo attenuato instructa, sicca ore dilatata, operculo
convexo, longe et tenuiter rostrato. Calyptra operculum tantum
obtegens.

Etat de Vera-Cruz: près de Jalapa, sur bois pourri, 1908
(n° 15145).

Diffère de toutes les autres espèce de la section *Euhynella*
par son inflorescence hétéroïque.

Rev. Bryol. 37:51 1910