

LEPIDOPILUM PRINGLEI Card.-- Autoicum, nitide lutescenti-viride. Caulis secundarius 1-3 centim. longus, complanatus, 4-5 millim. latus. Folia valde compressa, haud plicata, cultri-formi-oblonga, longiuscule acuminata, acutissima, lateralia valde asymmetrica et exterius curvatula, marginibus planis vel parce et anguste revolutis, superne denticulatis, nervis medium versus evanidis, cellulis linearibus, superioribus rhombeis, marginalibus angustioribus, sed limbum distinctum nullo modo efformantibus. Capsula in pedicello tuberculis et spiculis hirto, 5-8 millim. longo erecta inclinatave, oblonga, sicca sub ore constricta, opérculo longe et recte tenuirotrato. Calyptra plus minus piloso-squamosa. Peristomii dentes margine valde sinuosi, sublobati, strato ventrali angustissimo, rubente, lamellis sat prominentibus ornato.

Etat de Vera-Cruz : près de Jalapa, troncs d'arbres, 1908 (n° 10499, 15167).

Le *L. Mohrianum* C. Müll. se rapproche de cette espèce nouvelle par l'inflorescence monoïque, et le pédicelle hérissé de tubercules et d'aiguillons, mais, à en juger d'après la description, il en diffère par ses feuilles symétriques et plus brièvement acuminées.

Rev. Bryol. 37:51 1910