

MITTENOTHAMNIUM IMBRICATULUM Card. --- Autoicum, nitidum, lutescendi-viride. Caulis intricato-repens, saepe flagellis longis, gracillimis praeditus, plus minus regulariter pinnatus, ramis ascendentibus, haud complanatis, subteretibus, curvulis. Folia laxè imbricata, plicatula, concava, caulina late breviterque ovata, in acumen angustum, acutum, breviusculum sat abrupte constricta, ramea ovato-lanceolata, acuminata, marginibus planis vel basin versus acuminis parce reflexa, superne minute denticulata, costa gemella, ad tertiam partem folii producta, interdum simplici et medium versus evanida, cellulis angustis, linearibus, sat elongatis, extremitate superiore (praecipue in foliis rameis) dorso papilloso-prominulis. Capsula in pedicello tenui, flexuoso, rubente, 10-15 millim. longo, apice curvato nutans pendula, ovata vel oblonga, basi rotundata, sicca sub ore constricta, operculo brevissime conico vel mamillato.

Etat de Morelos : près de Cuernavaca. 1908 (n°15304).

Par son port, cette espèce rappelle assez *I'Eurhynchium praecox* ou *I' E. diversifolium*. Elle est voisine du *M. elegantulum* (Hook.) Card., mais en diffère par sa capsule plus petite, son pédicelle moins long, et son opercule plus court, non rostre.

Rev. Bryol. 37:55 1910