

MITTENOTHAMNIUM PRINGLEI Card. (1) – *M. Lehmanni* et *mexicano* (Besch.) Card. affine, primo statura, habitu, colore, etc. simillimum, sed capsula longiore, subcylindrica, operculoque rostro longiore curvulo praedito diversum; a secundo colore lutescente, foliis rameis angustioribus, marginibus ubique planis, et

(1) Le nom de *Microthamnium* doit être abandonné par les bryologues, ce nom ayant été imposé antérieurement à un genre d'Algues, lequel est valable. Je ferai remarquer que d'après les Règles de Vienne (1905), on doit employer pour le genre de Mousses : *Mittenothamnium* Hennings (1902), et nom *Stereohypnum* (Hpe.) Fleisch (1908).

capsula longiore et angustiore distinguitur. Autoicum. Capsula in pedicello circa 2 centim. longo horizontalis, nutans pendulave, subcylindrica, arcuatula, sicca sub ore constricta, collo distincto praedita, operculo conico-acuminato, longiuscule rostrato.

Etat de Oaxaca : Sierra de San Felipe, 1894 (n° 3a).

La forme de la capsule, longue et, étroite surtout à l' état sec, permet de distinguer facilement cette plante des espèces voisines; mais à l' état stérile, elle ne diffère guère du *M. Lehmanni* (Besch.) Card; elle a cependant les feuilles caulinaires un peu plus grandes, les raméales plus large et le tissu un peu moins serré, formé de cellules un peu moins longues. Les feuilles caulinaires, largement triangulaires-lancéolées, sont nettement denticulées dans le haut, et pourvues d'une nervure double distincte, parfois même assez longue. Contrairement à la description de Beschereille, il en est de même des feuilles caulinaires du *M. Lehmanni*, d'après un petit spécimen du type qui m'a été donné jadis par l'auteur lui-même.

Rev. Bryol. 37:54 1910.