

PRINGLEELLA Card. gen. nov. fam. Dicranacearum, trib. Ditrichearum. - Planta humilis, laxe cespitosa. Caulis brevissimus. Folia e basi lanceolata, longe acuminato-subulata, costa lata depressa. cellulis elongatis, laevibus. Inflorescentia synoica. Capsula in pedicello brevi erecta, gymnostoma, annulata, ovata, collo brevi, stomatibus nullis, operculo convexo, rostrato. Calyptra magna, campanula. Sporae magnae.

P. PLEURIDIODES Card. - Synoica, humilis, laxe cespitosa, habitu *Pleuridium* quoddam aemulans. Caulis brevissimus, erectus. Folia inferiora minima, superiora multo majora. congesta, e basi lanceolata sensim angustata et longe acuminato-subulata, superne canaliculata, integra, costa lata, depressa, totam fere subulam occupante, percurrente vel excurrente, cellulis omnibus elongatis, subrectangulis vel subrhomboidalibus, laevissimis. Capsula in pedicello brevi erecta, acumine foliorum perichaetialium superata, breviter ovata, collo brevi, crasso, stomatibus destituto, operculo convexo, recte vel paululum oblique rostrato. Peristomium nullum. Annulus persistens sed bene distinctus, e 2 vel 3 seriebus cellularum aurantiarum compositus. Calyptra magna, subinflata, late campanulata, lobata, laevissima, ad dimidium capsulae descendens. Sporae magnae, papillosae.

Etat de Jalisco: Sierra de San Esteban, 1908 (n. 10565).

Ce genre nouveau, que je suis heureux de dédier à M. Pringle. doit prendre place entre les *Garckea* et les *Eccremidium*. Il diffère des premiers par le port, les tiges courtes, l'absence du péristome, la coiffe plus grande, lisse, et des seconds également par le port, la forme des feuilles. la forme et les dimensions de la coiffe, l'anneau différencié etc.