

RHYNCHOSTEGIUM OBTUSIFOLIUM Besch. *in sched.*--Praecedenti habitu staturaque simillimum, foliis autem obtusis, plerumque minus denticulatis vel subintegris, costaque multo angustiore et longe ab apice evanida facile ab illo distinguitur. Folia nunc apice late rotundata, nunc subacuminata, semper tamen obtusa, plus minus distincte denticulata. Capsula in pedicello demum nigricante, laevi, siccitate lenissime sinistrorsum torto, brevi, 8-10 millim. longo inclinata vel suberecta, breviter ovata, sicca sub ore constricta, operculo longe recti- vel curvulirostrato. Autoicum.

Mexico (Hahn, 1868; herb. Bescherelle). District fédéral: Cañada, vallée de Mexico, 1908 (Pringle, n. 15205, 15277).

On distinguera aisément cette espèce du *R. rusciforme* (Neck.) Br. eur. par ses petites dimensions, ses feuilles ovales, obtuses, sa nervure plus faible, disparaissant très loin du sommet, et sa capsule dressée ou subdressée. D'autre part, ce ne peut être le *R. subrusciforme* (C. Müll.) Jaeg. qui, d'après la description, a le port du *R. callistomum* Besch., la capsule étroitement cylindrique et le pédicelle assez long.

Rev. Bryol. 37:71 1910