

RHYNCHOSTEGIUM PRINGLEI Card. - Ex affinitate *R. rusciformis* (Neck.) Br. eur., sed multo gracilius, viride. Caulis appressus, repens, stoloniformis, ramis ascendentibus, plus minus elongatis, arcuatis; vel flexuosis, laxissime et irregulariter pinnatis. Folia patentia, interdum subhomomalla, concava, compressione plicatula, e basi latiuscula late ovata vel ovato-oblonga, latissime breviterque acuminata, plerumque acuta, saepe subapiculata vel subobtusata, marginibus planis, fere e basi denticulatis, costa crassa, viridi, sub apice desinente, cellulis angustis, linearibus, elongatis, chlorophyllosis, alaribus laxioribus, oblongis. Caetera igrota.

Etat de Jalisco: chutes du Rio Blanco, 1890 (n. 761). Etat de de Morelos: près de Cuernavaca, 1907 et 1908 (n. 10434, 10525, 10536).

Se distingue du *R. rusciforme* (Neck.) Br. eur. par ses dimensions beaucoup plus faibles, son port plus grêle et ses feuilles de moitié plus petites, de forme plus ovale, moins acuminées; diffère de l'espèce suivante par ses feuilles plus aiguës et par sa nervure beaucoup plus forte.

Rev. Bryol. 37:70 1910