

THUIDIUM ROBUSTUM Card. -- *Dioicum*, robustum, caule erecto, valido, dense bipinnato, 6-10 centim. longo, paraphylliis ramosis permultis oblecto. Folia caulina maxima, conferta, erecta, latissime triangulari-cordata, profunde plicata, in acumen elongatum, subulatum, apicem versus denticulatum sat subito constricta, marginibus inferne plus minus revolutis, papillis prominulis crenulatis, costa in acumine desinente. Folia ramea et ramulina ovato-lanceolata, valde concava, subacuta, cellula apicali truncata et pluripapillata, marginibus argute denticulatis, costa ad 2,3 vel 3/4 evanida, reti pellucido, cellulis ovalibus vel rotundatis, dorso papilla magna, singula, valde prominente et sursum inclinata medio notatis. Folia perichaetia intima ciliis plus minus numerosis marginibus ornata. Capsula in pedicello purpureo, 2-3 centim. longo inclinata vel subhorizontalis cylindrico-arcuata, operculo convexo, longirostri.

District fédéral: Cima, 1908 (n° 10537, 10579); Sierra de Ajusco, 1907 (n° 10431 *in parte*). Mont Malintzi, près Puebla (A. Hecquet, 1904; herb. I. Thériot).

Cette belle espèce se reconnaît facilement à son port robuste, et à ses grandes feuilles caulinaires. La forme et le tissu des feuilles raméales la rapprochent du *Th. Schlumbergeri* Sch., mais d'après l'échantillon collé dans l'exemplaire du *Prodromus* du Muséum, celui-ci est beaucoup moins robuste, ayant la taille et le port du *Th. miradoricum* Jaeg., et les feuilles caulinaires beaucoup plus petites et moins longuement acuminées.

Rev. Bryol. 37:52 1910